

أولياًونا الاعزاء

إن طفلكم على وشك الخوض في عملية جراحية بدون إقامة في المستشفى والذي سيتم تحت التبيج العام. في هذه الرسالة الإشعارية نخبركم عن عملية التبيج للمرضى غير المقيمين في المستشفى وأعمال الاستعداد والمعالجة ما بعدها وعن كل ما يجب عليكم وعلى طفلكم معرفته ومراعاته حتى تنفذ العملية الجراحية والتبيج بشكل سلس ومع أعلى درجة من السلامة.

إن جمع واستخدام الأجوبة من استمارة الاستبيان عن التاريخ الطبي هو الجزء الأهم والاساسي في الاستعداد لعملية التبيج وعادة ما يكون استخدامها كافٍ لإيفاء غرض الاستعداد للخوض في العملية. إلا أن في بعض العمليات الجراحية وفي حالة المعاناة سابقاً من بعض الامراض من قبل طفلكم قد يكون من الضروري إجراء المزيد من الفحوص والمعاينات الطبية. ويجب مناقشتها مع الطبيب المتخصص للأطفال لديكم. في المحادثة التوضيحية يمكن لكم طرح كل ما لديكم أو لدى طفلكم من اسئلة محتملة حول عملية التبيج. سوف نشرح لكم خطوات الاجراء (بدء العملية، مواصلتها وإتمامها) وعن المخاطر العامة والخاصة في عملية التبيج.

كما يمكن من خلال تصرفاتكم منع وقوع تعقيدات (مثلاً تسرب كمية كبيرة من محتويات المعدة إلى داخل الرئة) إلى مدى كبير أثناء عملية التبيج. لذلك نرجو منكم مراعاة بشكل حتمي التوجيهات التالية، ما دام لم يعط الطبيب لديكم توجيهات أخرى خاصة بحالتهم:

- فيما يتعلق بالأكل: لغاية ٦ ساعات قبل بدء عملية التبيج يمكن تناول وجبة خفيفة من الطعام. بعد ذلك الزمن، لا يمكن تناول اي شيء آخر (وهذا يشمل عدم تناول العلكة، حلويات صغيرة، او ما شابه)!
- فيما يتعلق بشرب السوائل: من ٦ ساعات إلى ساعتين قبل بدء عملية التبيج لا يسمح بشرب ما يزيد عن فنجان او فنجانين من الماء او الشاي (بدون حليب).

يرجى إخبار طبيهم في حالة ما إذا لم تكن اتبعم هذه التوجيهات بدقة!

بعد مشاورتنا فيها يخصها، يمكن لطفلكم تعاطي الأدوية الاعتيادية لديه مع شرب جرعة من الماء. لا ينبغي من الاطفال تعاطي الانسولين بالحقنة إلا بعد مشاورتنا بشأنه. يرجى عدم استعمال المكياج او كريمات الوجه أو طلاء الاظافر. نرجو إخبارنا في حالة وقوع اية التهابات حموية أو أدوية قد تم تعاطيها، وإخبارنا كذلك عن آخر تناول طعام وسوائل.

فوراً قبل إجراء التدخل الجراحي:

- إفراغ المثانة / معاينة حفاظات البول
- إزالة ساعة اليد واية مجوهرات
- إزالة العدسات اللاصقة في العين

خطوات إجراء العملية في غرفة العمليات / قاعة المعالجة:

- يتم اعطاء دواء سائل للتهنئة حوالي ٢٠ دقيقة قبل بدء عملية التبيج.
- يتم زرع قنطار مستقر في عرق مناسب من العروق.
- يتم ربط أجهزة مراقبة أداء القلب ودوران الدم والتنفس.
- نمكن طفلكم من تنفس الاكسجين من خلال قناع يوضع على الوجه.
- ثم يعطى دواء التخدير. كثيراً ما يرد الطفل بعد حقنه بدواء التخدير بالكحة. إلا أن هذا حادث اعتيادي وكثير الوقوع ولا يمثل اي تعقيد في الإجراءات!

حتى هذا الوقت يمكن لكم البقاء مع طفلكم.

وعادة ما يُتلقى خطوة دخول حالة النوم بمريح. من أجل رفع مستوى السلامة في عملية التبيج يتم ربط الأنابيب بعد التنويم: يتم إدخال انبوبة بلاستيكية في القصبة الهوائية. كبديل قد يتم وضع قناع على الفم (القناع الحنجري) احياناً قد تظهر بعد التبيج آلام في الحلقوم بسبب عملية إدخال الانبوبة البلاستيكية. إلا أن الارتفاع في مستوى السلامة المكتسبة من خلال وضع هذه الانبوبة تفوق، وبمساحة بعيدة، عدم الراحة هذه التي قد تحدث. لا يمكن الاستغناء عن استعمال الأنابيب البلاستيكية إلا في عملية جراحية بسيطة وقصيرة جداً.

يوفر فن التبنيج المعاصر من خلال التحكم في الجرعات الدوائية واستعمال تركيبات مختلفة من أدوية التبنيج وكذلك من خلال استخدام أجهزة التبنيج المعاصرة مستوى جيد من التحكم في التنفس ودوران الدم ووظائف بدنية مهمة اخرى. التعقيدات التي قد تكون قاتلة في عمليات التبنيج تشمل هذه التعقيدات الاضطرابات الشديدة في أداء القلب لغاية توقف القلب والنقص في توفير الاكسجين أو ضيق النفس أو غيرها من المشاكل التنفسية والتي قد تظهر ايضاً بسبب ردود افعال حساسية قليلة الوقوع حتى في حالات وجود تاريخ مشاكل صحية. كذلك فإن الرشف أو الشفط، اي تسرب محتويات المعدة إلى الرئة، قليل الوقوع، وذلك فقط في حالة تناول الغذاء أو الشرب أو التدخين قبل بدء العملية. كما تحدث حالات من الالم في الحلقوم أو الغثيان أو القيء أو الارتجاف أو التشنجات المؤلمة في العضلات بشكل منفرد من حين إلى حين إلا أنها لا تقع إلى بشكل مؤقت. يحتمل وقوع اضرار للأسنان أو فقدانها بصفة خاصة في حالة تضرر الاسنان أو وجود التهابات في اللثة مسبقاً.

بعد انتهاء عملية التبنيج يمكنكم المرور عند طفلكم على الفور، حيث أن الطفل يشعر بالراحة أكثر في حالة وجود شخص يثق فيه. عادة يمكن لكن العودة إلى البيت مع طفلكم بعد مرور ساعتين من انتهاء التبنيج. وذلك بشرط أن يكون دوران الدم لدى طفلكم في حالة مستقرة وأن يكون بإمكان طفلكم الوقوف والمشكل بدون مشكلة. قليلاً بعد انتهاء عملية التبنيج يتلقى طفلكم منا بعض السوائل للشرب، ما دام لم تكن هناك توصيات اخرى في هذا الشأن من الطبيب.

في البيت:

- راعوا طفلكم بدقة حتى اليوم التالي ولا تسمحوا لطفلكم اللعب خارج الشقة
- عند بروز آلام، اعطوا الادوية في الجرعات المحددة في وصفاتها
- ما دام لم ينصح الطبيب بشيء آخر في هذا الشأن، يمكن بدء تناول الطعام فوراً بعد العملية (وجبات خفيفة)

في حالة بروز مشاكل عند طفلكم التي قد يكون سببها عملية التبنيج،
يمكن لكن الاتصال بنا على الرقم الهاتفي الثاني: ٠١٦٠ ٩٦٨٧٣٢٥١
أو الاتصال بنا من خلال البدالة لديكم.

في حالة بروز مشاكل تنفسية أو في دوران الدم أو الوعي والتي ترونها مهددة لصحة طفلكم يرجى الاتصال برقم ١١٢.

نشكركم على جهودكم وحسن تعاونكم!

فرقتكم للتبنيج - نقطة التبنيج