

Дорогие родители!

Вашему ребёнку предстоит амбулаторная операция под общим наркозом. В этой памятке Вы получите информацию об амбулаторной анестезии, подготовке к ней, возможным последующим процедурам и об всём, что необходимо знать и соблюдать Вам и Вашему ребёнку, чтобы операция и наркоз были проведены с максимальным комфортом и безопасностью.

Анализ опросника по анамнезу является важной частью подготовки к наркозу и, как правило, его достаточно. Для некоторых операций и при наличии некоторых болезней может потребоваться проведение дополнительных исследований. Для этого необходимо обратиться к Вашему педиатру. В ходе разъяснительной беседы Вы можете задавать нам любые вопросы, которые интересуют Вас и ребёнка в связи с наркозом. Мы разъясним Вам порядок проведения (вводный наркоз, поддержание и вывод из наркоза), а также общие и специфические риски наркоза.

Ваши действия могут в значительной мере помочь предотвратить инциденты (прежде всего опасное попадание содержимого желудка в лёгкие) во время анестезии. В связи с этим строго соблюдайте приведённые ниже указания, если врач не предписал Вам иное в Вашем конкретном случае:

- Приём пищи: за 6 часов до начала анестезии можно принять лёгкую пищу. После этого ничего есть нельзя (в том числе жевательные резинки, конфеты и т.п.)!
- Питьё: в период от 6 до 2 часов до начала анестезии разрешается выпить только 1-2 стакана воды или чая (без молока).

Сообщите Вашему врачу, если Вы не выполнили в точности данные указания!

Свои обычные лекарства ребёнок может принять по согласованию с нами, запив их одним глотком воды. Детям с диабетом разрешается вводить инсулин только со согласования с нами. Не наносите и не разрешайте ребёнку наносить косметику, крем для лица и лак для ногтей. Сообщите нам об острых инфекциях, принятых медикаментах и о времени последнего приёма пищи и жидкости.

Непосредственно перед операцией:

- опорожнить мочевой пузырь / проверить подгузники.
- снять часы и украшения.
- вынуть контактные линзы.

Порядок проведения в операционной / процедурном кабинете:

- Примерно за 20 минут до начала наркоза ребёнку дают выпить успокаивающий сок.
- Вводится внутривенный катетер.
- Подключаются мониторы для контроля работы сердца, кровообращения и дыхания.
- Ребёнку надевается маска для получения кислорода.
- Затем вводится средство, способствующее быстрому засыпанию. Зачастую после введения у детей возникает реакция в виде кашля. Это происходит часто и не является осложнением!

До этого момента Вы можете оставаться возле ребёнка.

Процесс засыпания обычно ощущается приятно. В целях повышения безопасности наркоза после засыпания проводят интубацию: пластиковую трубку (тубус) вводят в трахею. В качестве альтернативы может вводиться маска в глотку (гортанная маска). Иногда после наркоза могут появляться временные жалобы на боли в горле вследствие интубации. Однако повышение безопасности благодаря интубации намного значимее этого неудобства. Лишь при очень коротких вмешательствах можно отказаться от интубации.

Благодаря точному дозированию и комбинированию различных средств для наркоза и применению современных наркозных аппаратов анестезия сегодня может обеспечить хороший контроль дыхания, кровообращения и других важных функций организма. Опасные для жизни осложнения после наркоза. Серьёзные проблемы с сердцем и кровообращением вплоть, включая остановку сердца, недостаточное снабжение кислородом, удушье и другие проблемы с дыханием, которые могут возникать также вследствие аллергических реакций, встречаются крайне редко даже при наличии заболеваний. Также очень редко возникает так называемая аспирация, т.е. попадание содержимого желудка в лёгкие, которая чаще имеет место лишь в случае несвоевременного приёма пищи, жидкости или курения. Боли в шее, тошнота, рвота, тремор или неприятная мышечная боль возникают в редких случаях, но носят лишь временный характер. Повреждения или потеря зубов может иметь место лишь при наличии дефектов зубов или парадонтоза.

После наркоза Вы сразу же можете вернуться к ребёнку, так как он будет чувствовать себя комфортнее в присутствии родного человека. Как правило, уже через два часа после завершения наркоза Вы можете уйти домой вместе с ребёнком. Главное, чтобы кровообращение ребёнка было стабильным и он мог без трудностей встать и ходить. Уже через короткое время после наркоза мы дадим ребёнку немного попить, если хирургом не были даны иные рекомендации.

Дома:

- присматривайте за ребёнком в течение дня и не разрешайте ему играть за пределами квартиры.
- при появлении болей дайте ему назначенные лекарства в предписанной дозировке.
- если нет иных рекомендаций хирурга, можно сразу начать принимать (лёгкую) пищу.

При появлении у ребёнка проблем, связанных с наркозом,
звоните нам по телефону: **0160 96873251**
или обратитесь к Вашему хирургу.

Если возникли нарушения дыхания, кровообращения или потеря сознания, которые Вы считаете опасными,
наберите **112**.

Мы благодарим Вас за внимание и сотрудничество!

Искренне Ваш, коллектив анестезиологов – anästhesiepunkt.